

Antispasmodik Usus

Kejang usus

"Kejang usus" adalah istilah luas yang merujuk pada kejang abnormal otot tak sadar pada organ dalam. Masalah ini paling sering terlihat pada organ seperti usus halus dan usus besar, saluran empedu dan ureter. Kolik sering terjadi pada kejang usus. Kejang pada usus besar atau kecil juga bisa disertai dengan perut kembung dan diare.

Kejang memiliki berbagai penyebab. Litiasis, gastroenteritis, alergi makanan, reaksi obat dan stres emosional adalah beberapa contohnya.

Antispasmodik usus memiliki fungsi utama relaksasi otot dan kontrol kejang, sehingga mengurangi nyeri spasmodik. Mengingat banyaknya penyebab kejang, antispasmodik usus hanya menawarkan pereda nyeri dan bukan untuk penyembuhan permanen. Oleh karena itu, penggunaan obat-obatan ini secara sembarangan harus dihindari. Untuk menghasilkan penyembuhan radikal, penting untuk mengidentifikasi penyebab penyakit dan mendapatkan perawatan yang tepat. Mengonsumsi antispasmodik usus sebelum konsultasi medis dapat menutupi tanda-tanda penyakit serius seperti apendisitis akut, dan mempersulit dokter Anda untuk membuat diagnosa yang akurat. Akibatnya, pengobatan bisa tertunda dan dampaknya bisa sangat serius. Seorang dokter biasanya tidak akan meresepkan antispasmodik usus untuk pasiennya kecuali jika dokter tersebut telah mendapat pemahaman yang jelas tentang kondisi pasien dan membuat diagnosa yang pasti.

Contoh umum antispasmodik usus termasuk hoisin-N-butilbromida dan alverin sitrat, keduanya dapat meredakan kolik yang disebabkan oleh stres gastrointestinal.

Saran Pengobatan

1. Disarankan mengonsumsi obat 30 menit hingga satu jam sebelum makan sesuai instruksi dokter.
2. Minum obat sesuai saran dokter atau ahli perawatan kesehatan. Efek samping umumnya meliputi mulut kering, pandangan buram, sembelit dan sulit buang air kecil. Efek tersebut akan hilang jika pengobatan dihentikan.

Penyimpanan Obat

Obat harus disimpan di tempat sejuk dan kering. Umumnya, obat tidak perlu disimpan di lemari es kecuali disebutkan pada label. Obat oral harus disimpan dengan baik untuk mencegah konsumsi secara tidak sengaja oleh anak-anak.

Kantor Obat-obatan
Departemen Kesehatan
Jan 2021