

Catatan penggunaan

- Jika supositori terlalu lembek, simpan di lemari es sebentar agar dapat digunakan.



- Beberapa supositori perlu disimpan di lemari es; silahkan mengacu pada instruksi masing-masing produk. Jika disimpan di lemari es, biarkan supositori pada suhu ruang sebentar sebelum digunakan.
- Jika perlu, gunakan air atau pelumas berbahan dasar air di ujung supositori sebelum dimasukkan.
- Anda dapat merasa ingin mengeluarkan supositori. Rasa tersebut akan mereda saat supositori meleleh, dan ini membutuhkan waktu beberapa menit.
- Jika hanya diperlukan separuh supositori, potong supositori memanjang dan simpan setengah sisanya untuk dosis selanjutnya.

Kemungkinan efek samping

Tak lama setelah supositori dimasukkan, Anda dapat mengalami efek samping ringan seperti rasa terbakar ringan atau iritasi dubur, diare, dan ketidaknyamanan perut.

Segera konsultasikan dengan dokter jika Anda mengalami reaksi alergi seperti ruam kulit, wajah atau tangan membengkak dan kesulitan bernafas.

Penyimpanan

Simpan obat-obatan di tempat sejuk dan kering serta jauh dari panas dan cahaya langsung. Umumnya, tidak perlu menyimpan di lemari pendingin kecuali disebutkan demikian pada label obat.

Simpan obat-obatan di luar jangkauan anak-anak agar tidak tertelan secara tidak sengaja.

Selebaran informasi ini hanya berupa rujukan.

Obat-obatan harus digunakan sesuai arahan dokter dan apoteker.

Untuk bertanya, silahkan hubungi dokter, staf apoteker atau petugas Kesehatan lainnya.

Jangan berbagi obat-obatan dengan orang lain.

CARA menggunakan

SUPOSITORI DUBUR



PESARI
SUPOSITORI DUBUR

OBAT KUMUR
OBAT TETES HIDUNG



Drug Office
Department of Health



Cara menggunakan Supositori Dubur

1 Cuci tangan dengan sabun hingga benar-benar bersih.

2 Jika perlu, kenakan penutup jari atau sarung tangan sekali pakai.


3 Buka pembungkus.



4 Berbaring menyamping. Jaga agar betis tetap lurus dan tekuk paha ke arah perut.

5 Ekspos area dubur dengan mengangkat bokong dengan satu tangan.

Anak-anak dapat berbaring telungkup di atas pangkuan orang dewasa.



6 Rilekskan lubang dubur dan gunakan tangan yang lain untuk dengan lembut mendorong supositori berujung bulat ke dalam dubur hingga kedalaman sekitar 2 cm untuk bayi dan sekitar 3 cm untuk orang dewasa.

7 Tahan bokong selama beberapa detik. Terus berbaring selama 5 hingga 15 menit agar supositori tidak terlepas.

Duduk dengan kaki bersilang adalah postur lain yang baik.

8 Buang penutup jari atau sarung tangan dan cuci tangan Kembali.