

आन्द्रीय एन्टिस्पास्मोडिक्स

आन्द्रा ऐंठन

"आन्द्रा ऐंठन" एक व्यापक शब्द हो जुन आन्तरिक अंगहरूको अनैच्छिक मांसपेशीहरूको असामान्य आवेगलाई संकेत गर्छ। समस्या सामान्यतया साना र ठूला आन्द्रा, पित्त नलिका र युरेटर जस्ता अंगहरूमा देख्न सकिन्छ। कोलिक अक्सर आन्द्रा ऐंठनमा हुन्छ। ठूला वा साना आंतहरूको बन्धन पनि पेटको उदासीन र पखालाको साथ हुन सक्छ।

Spasm का विभिन्न कारणहरू छन्। लिथियासिस, ग्यास्ट्रोएन्टेरिटिस, खानाबाट एलर्जी, औषधि प्रतिक्रिया र भावनात्मक तनाव केही उदाहरणहरू हुन्।

आन्द्रीय एन्टिस्पास्मोडिक्सको मांसपेशी रिलक्सन र आवरण नियन्त्रणको प्रमुख कार्यहरू हुन्छन्, यसैले स्पास्मोडिक दुखाइ कम हुन्छ। आक्रान्तिका लागि असंख्य कारणहरू दिइएमा, आन्द्रीय एन्टिस्पास्मोडिक्सले स्थायी उपचारको सट्टा केवल पीडाबाट राहत प्रदान गर्दछ। यसकारण यी औषधीहरूको अन्धाधुन्ध प्रयोगबाट अलग रहनु पर्छ। कडा उपचारलाई प्रभाव पार्न रोगको कारण पहिचान गर्न र उचित उपचार लिन आवश्यक छ। चिकित्सकीय परामर्श भन्दा पहिले आन्द्रा एन्टिस्पास्मोडिक्स लिनेले गम्भीर रोगहरू जस्तै कम्पेन्ड एपेन्डिसाइटिसको लक्षण ढाक्न सक्छ, र तपाईंको डाक्टरलाई सही निदान गर्न अझ गाह्रो बनाउँदछ। उपचार परिणामको रूपमा ढिलाइ हुन सक्छ र परिणाम धेरै गम्भीर हुन सक्छ। डाक्टरले बिरामीको अवस्थाको स्पष्ट समझ नपाएसम्म र निश्चित निदान नगरेसम्म प्रायः उसको / उनको बिरामीको लागि आन्द्रीय एन्टिस्पास्मोडिक्स तोक्दैन।

आन्द्रीय एन्टिस्पास्मोडिक्सको सामान्य उदाहरणहरूमा हाइकोसिन-एन-ब्युटिलब्रोमाइड र एल्भेरिन साइट्रेट समावेश छ, ती दुबै दुबै कोलिक को कारण हुने शूललाई राहत दिन सक्छन्।

औषधि प्रयोगमा सल्लाह

1. खाना खानु भन्दा पहिले 30 मिनेट देखि एक घण्टा सम्म वा तपाईंको डाक्टरले निर्देशन गरे अनुसार औषधि लिन सल्लाह दिइन्छ।
2. तपाईंको डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सल्लाह अनुसार औषधि लिनुहोस्। सामान्य साइड इफेक्टमा मुख सुक्खा, धमिलो दृष्टि, कब्ज र पेशाबमा कठिनाई समावेश छन्। औषधी रोकेको खण्डमा यस्तो असर कम हुन्छ।

औषधिको भण्डारण

औषधिहरू सुख्खा र चिसो ठाउँमा राख्नुपर्दछ। सामान्यतया, औषधि लेबलमा उल्लेख नगरेसम्म तिनीहरूलाई रेफ्रिजरेट गर्न आवश्यक पर्दैन। बच्चाहरू द्वारा गलत उपभोगको दुर्घटनाबाट बच्न मौखिक औषधिहरू राम्रोसँग भण्डारण गर्नुपर्दछ।

औषधि कार्यालय

स्वास्थ्य विभाग

2021 जनवरी