

หมายเหตุการใช้งาน

- หากคุณกำลังสวมใส่คอนแทคเลนส์ ให้ถอดออกก่อนการใช้ยาหยอดตา หลังจากใช้ยาหยอดตาแล้ว โปรดรออย่างน้อย 15 นาทีก่อนสวมใส่คอนแทคเลนส์
- ห้ามขยี้ ตาด้วยมือของคุณหลังจากการใช้ยาหยอดตา
- หากคุณกำลังใช้ยาหยอดตาสองชนิดที่แตกต่างกัน หรือยาทาตาสำหรับดวงตาข้างเดียวกัน ให้ใช้ยาทั้งสองโดยเว้นช่วงเวลาห่างกันสักสองถึงสามนาที
- ขอให้สมาชิกในครอบครัวของคุณ หรือคนอื่นหยดยาหยอดตาให้ให้คุณ หากมีความจำเป็น
- ห้ามใช้ยาหยอดตาที่เปลี่ยนสี เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุแล้ว



ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

ยาหยอดตาอาจทำให้การมองเห็นของคุณไม่ชัดเจนชั่วคราว และทำให้รู้สึกไม่สบายตาเล็กน้อย ห้ามขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าการมองเห็นของคุณจะกลับมาชัดเจนอีกครั้ง

ปรึกษาแพทย์ของคุณทันที หากคุณยังคงมีอาการต่าง ๆ หรือหากพบอาการแพ้ เช่น มีผื่นแดงบนผิวหนัง ใบหน้า หรือมือบวม และหายใจลำบาก

การจัดเก็บยา

จัดเก็บยาไว้ในสถานที่แห้งและเย็นรวมทั้งห่างไกลจากรับความร้อน และแสงแดดโดยตรง ยาหยอดตาบางชนิดจำเป็นต้องจัดเก็บไว้ในตู้เย็น โปรดอ้างอิงไปยังคำแนะนำของแต่ละผลิตภัณฑ์

จัดเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กเพื่อหลีกเลี่ยงการกลืนกินยาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ทิ้งยาหยอดตาที่เหลือหลังจากการเปิดขวดแล้ว 4 สัปดาห์

แผ่นพับข้อมูลนี้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ควรใช้ตามแพทย์สั่ง และที่เภสัชกรแนะนำ สำหรับข้อซักถาม โปรดติดต่อแพทย์ของคุณเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายยา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ ห้ามแบ่งปันยาของคุณให้กับผู้อื่น

วิธีใช้

ยาหยอดตา



ยาทาตา
ยาหยอดหู
ยาหยอดตา
โลชั่นกำจัดเหา
ยาทิด



Drug Office
Department of Health



วิธีใช้


ยาหยอดตา

1 ล้างมือของคุณด้วยสบู่ให้
ทั่วถึง


2 เขย่าขวดเบา ๆ นำฝา
ขวดออกโดยไม่ให้สัมผัส
ที่ปลายขวด

3 เอียงศีรษะของคุณไป
ด้านหลังแล้วมองขึ้น
ด้านบนดึงเปลือกตา
ด้านล่างลงไปยังงูใต้
ตาเบา ๆ

4 หยดยาหยอดตาเข้าไปในถ
งใต้ตา ห้ามมิให้ปลายขวดส
ัมผัสกับดวงตา ขนตา หรือ
เปลือกตาของคุณเพื่อหลีก
เลี่ยงการบาดเจ็บที่ดวงตา
และการปนเปื้อนที่ปลาย
ขวด



6 เช็ดส่วนเกินของยารอบ
ๆ ดวงตาด้วยกระดาษขำ
ระที่สะอาด



5 กลับตาของคุณ แล้วใช้นิ้ว
ของคุณกดลงที่หัวตาเบา ๆ
เป็นเวลาสองถึงสามนาทีเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ยาหยอดตาไหล
เข้าจมูก หรือลำคอ

7 ห้ามล้าง หรือเช็ดปลาย
ขวด ปิดฝาขวดกลับเข้าที่
เดิม แล้วปิดฝาให้แน่นท
นที่

