

หมายเหตุการใช้งาน

- หากคุณกำลังสวมใส่คอนแทคเลนส์ ให้ถอดออกก่อนการใช้ยาทาตาไม่ควรสวมใส่คอนแทคเลนส์ตลอดการรักษ
- ห้ามขยี้ตาด้วยมือของคุณหลังจากการใช้ยาทาตา
- หากคุณกำลังใช้ยาหยอดตาสองชนิดที่แตกต่างกันหรือยาทาตาสำหรับดวงตาข้างเดียวกัน ให้ใช้ยาทั้งสองโดยเว้นช่วงเวลาห่างกันสักสองถึงสามนาที่
- ขอให้สมาชิกในครอบครัวของคุณหรือคนอื่นทายาตาตาให้กับคุณ หากมีความจำเป็น
- ห้ามใช้ยาทาตาที่เปลี่ยนสี เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุแล้ว



ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

ยาทาตาอาจทำให้การมองเห็นของคุณไม่ชัดเจนชั่วคราว และทำให้รู้สึกไม่สบายตาเล็กน้อย ห้ามขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าการมองเห็นของคุณจะกลับมาชัดเจนอีกครั้ง

ปรึกษาแพทย์ของคุณทันทีหากคุณยังคงมีอาการต่างๆ หรือหากพบอาการแพ้ เช่น มีผื่นแดงบนผิวหนัง ใบหน้า หรือมือบวม และหายใจลำบาก

การจัดเก็บ

จัดเก็บยาไว้ในสถานที่แห้ง และเย็น รวมทั้งห่างไกลจากรับความร้อน และแสงแดดโดยตรง ตามปกติแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องจัดเก็บยาทาตาไว้ในตู้เย็น ยกเว้นจะระบุไว้บนฉลากยา

จัดเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กเพื่อหลีกเลี่ยงการกลืนกินยาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ทิ้งยาทาตาที่เหลือหลังจากการเปิดขวดแล้ว 4 สัปดาห์

แผ่นพับข้อมูลนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ควรใช้ยาตามแพทย์สั่ง และที่เภสัชกรแนะนำ สำหรับข้อซักถาม โปรดติดต่อแพทย์ของคุณ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายยา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ ห้ามแบ่งปันยาของคุณให้กับผู้อื่น


วิธีใช้

ยาทาตา

น้ำบ้านปากซึ่งใช้ในการบำบัดโรค
ยาหยอดจมูก

ยาทาตา

ยาหยอดหู
ยาหยอดตา




Drug Office
Department of Health



วิธีใช้ ยาทาตา


1 ล้างมือของคุณด้วยสบู่ให้
ทั่วถึง



2 นำฝาชวดออกโดยมิให้
สัมผัสที่ปลายชวด



3 เอียงศีรษะของคุณไปด้าน
หลัง แล้วมองขึ้นด้านบน ดี
งเปลือกตาด้านล่างลงไปยังถุง
ใต้ตา



4 บีบยาทาตาเข้าไปในถุงใต้ตา
ประมาณ 1 ซม. ห้ามมิให้ปลาย
ชวดสัมผัสกับดวงตา ขนตา
หรือเปลือกตาของคุณเพื่อหลีกเลี่ยง
การบาดเจ็บที่ดวงตาและ
การปนเปื้อนที่ปลายชวด



5 หลับตาของคุณสักครู่จากนั้นกระ
พริบตาสักสองถึงสามครั้งเพื่อทำ
ให้ยาทาตากระจายบนดวงตาอย่าง
สม่ำเสมอ เช็ดส่วนเกินของยาทา
ตารอบ ๆ ดวงตาด้วยกระดาษ
ชำระที่สะอาด



6 ห้ามล้าง หรือเช็ดปลายชวด
ของยาทาตาปิดฝาชวดกลับ
เข้าที่เดิม แล้วปิดฝาให้แน่น
ทันที

