

หมายเหตุการใช้งาน

- ห้ามกลืนกิน
- ห้ามกิน หรือดื่ม หรือห้ามบ้วนทิ้งทันที
หลังจากการใช้น้ำยาบ้วนปาก

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

น้ำยาบ้วนปากบางชนิดสามารถทำให้การรับรสชาติเปลี่ยนไปได้ หรือเกิดคราบบนฟันได้

ปรึกษาแพทย์ของคุณทันทีหากคุณยังคงมีอาการต่าง ๆ หรือหากพบอาการแพ้ เช่น มีผื่นแดงบนผิวหนัง ใบหน้า หรือมือบวม และหายใจลำบาก

การจัดเก็บ

จัดเก็บยาไว้ในสถานที่แห้ง และเย็น รวมทั้งห่างไกลจากความร้อน และแสงแดดโดยตรง ตามปกติแล้วไม่จำเป็นต้องจัดเก็บยาทาตาไว้ในตู้เย็น ยกเว้นจะระบุไว้บนฉลากยา

จัดเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กเพื่อหลีกเลี่ยงการกลืนกินยาโดยไม่ได้ตั้งใจ

แผ่นพับข้อมูลนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
ควรใช้ยาตามแพทย์สั่ง และที่เภสัชกรแนะนำ
สำหรับข้อซักถาม โปรดติดต่อแพทย์ของคุณ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายยา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ
ห้ามแบ่งปันยาของคุณให้กับผู้อื่น

วิธี ใช้

น้ำบ้วนปาก ซึ่งใช้ในการ บำบัดโรค

อุปกรณ์เพียงอย่างเดียวในภาวะฉุกเฉินกรณี
ยาเหน็บทวารหนัก

น้ำบ้วนปากซึ่งใช้ในการบำบัดโรค
ยาหยอดจมูก
ยาทาตา



Drug Office
Department of Health



วิธีใช้ น้ำบ้วนปากซึ่งใช้ ในการบำบัดโรค

1 บ้วนปากของคุณด้วยน้ำ



2 วัดปริมาณยาน้ำบ้วนปาก
ให้มีปริมาณที่เหมาะสม

! อ้างอิงวิธีการเจือจางไปยังแต่ละ
ฉลากยาตามลำดับ สำหรับการ
กลั้วปากด้วยโรมอล (thymol)
ให้เจือจางยาน้ำบ้วนปาก 1 ส่วน
ด้วยน้ำ 3 ส่วน

3 อมน้ำยาบ้วนปากไว้ในปาก
แล้วกลั้วปากไปรอบๆ ด้าน
ในปาก



! ระยะเวลาที่แนะนำมีความ
แตกต่างกันไปตามการเตรียมการ
ต่าง ๆ

4 บ้วนน้ำยาบ้วนปากทิ้ง

