

## دافع تشنج اور دافع متلی

### آنتوں کا تشنج اور قے

آنتوں کا تشنج بڑی یا چھوٹی آنتوں کا بے قابو پٹھوں کا کھچاؤ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپہارہ، پیٹ میں کھچاؤ، اسہال یا قبض بھی ہو سکتا ہے۔ قے کرنا یا ابکائی (جو ایمیسیس کے طور پر بھی معروف ہے) غذائی نالی کے ذریعے معدے کے مواد کو منہ سے باہر جانے پر مجبور کرنا ہے۔

یہ دونوں بیماریاں نہیں ہیں بلکہ بہت سی بنیادی طبی حالتوں کی عمومی علامات ہیں۔ آنتوں کا تشنج عام طور پر تکلیف دہ آنتوں کے سنڈروم، گیسٹروانٹریٹیس، فوڈالرجی اور جذباتی تناؤ میں پایا جاتا ہے۔ قے گیسٹروانٹریٹیس، ابتدائی حمل میں صبح کی بیماری، فوڈ پوائزنگ، سفری بیماری، شدید درد، مائیگرین، چکر، اور کیموتھراپی یا اینسٹھیسیا کے منفی رد عمل میں سے ایک ہے۔ شدید قے سے پانی کی کمی اور الیکٹرولائٹ عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے۔

### علاج

آنتوں کے تشنج اور قے دونوں کا حتمی علاج بنیادی وجہ معلوم کرنا اور طبی نگرانی میں مناسب علاج لینا ہے۔ جب بنیادی علامت کے علاج معالجے کے باوجود علامات برقرار رہتی ہیں تو، دافع تشنج ادویات یا دافع قے ادویات (دافع بیماری کی گولیوں) کو آنتوں کے تشنج کو دور کرنے یا قے سے افاقے کے لیے بالترتیب زیر غور لایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ، دافع قے ادویات کا استعمال ایسے حالات میں قے سے بچنے کے لیے کیا جاسکتا ہے جہاں اس کی توقع کی جاسکتی ہے، جیسے سفری بیماری، صبح کی بیماری، کیموتھراپی یا سرجری۔

### دافع تشنج

دافع تشنج ہموار پٹھوں کو آرام دیتے ہیں، اس طرح سے تشنج کے درد کو دور کرتے ہیں۔ ان کو دو اہم اقسام میں درجہ بند کیا گیا ہے: ہموار پٹھوں میں آرام دینے والے جیسے الورین اور میپیورین، اور اینٹی کولینرجکس جیسے ہائیوسین۔

زیادہ تر دافع تشنج یا تو صرف فارمیسی ادویات ہیں یا نسخے کی ادویات ہوتی ہیں۔ وہ خوراک کی بہت سی شکلوں میں دستیاب ہیں جیسے گولیاں، کیپسول، شربت، ٹیکے اور پیچز۔

### دافع تشنج کے عام ضمنی اثرات اور احتیاطی تدابیر

احتیاطی تدابیر	عام ضمنی اثرات	دافع تشنج کی اقسام
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ پیرالائٹک ایلیس کے مریضوں کو نہیں دیا جانا چاہیے</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ متلی</li> <li>♦ سانس کی بندش</li> <li>♦ سر درد</li> <li>♦ چکر</li> <li>♦ پروریٹیس اور خارش</li> </ul>	<p>1. ہموار ہٹھوں کے لیے سکون آور</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ بچوں اور ضعیف العمروں میں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں</li> <li>♦ گیسٹرو ایسوفیگیل ریفلکس بیماری، شدید مایوکارڈیل انفارکشن، ہائپر ٹینشن، ہائپر تھائرائڈزم، اور جو زاویہ بند گلوکوما کے لیے حساس ہیں کے مریضوں میں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں</li> <li>♦ مایستھینیا گریوس، ہائلورک سٹینوسس، پیرالائٹک ایلیس اور پروسٹیتک انلارجمنٹ کے مریضوں کو نہیں دیا جانا چاہیے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ غنودگی</li> <li>♦ قبض</li> <li>♦ تیز / بے قابو دل کی دھڑکن</li> <li>♦ پیشاب کی فوری ضرورت اور برقراری</li> <li>♦ دھندلی نظر</li> <li>♦ خشک منہ</li> <li>♦ کیکپاہٹ</li> </ul>	<p>2. اینٹی کولینرجکس</p>

#### دافع تشنج لینے کے بارے میں عمومی مشورہ

- دافع تشنج بنیادی طور پر مستقل علاج کی بجائے علامات میں آرام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہذا ان ادویات کے زیادہ استعمال سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔
- چونکہ دافع تشنج علامات کو دبانے اور بنیادی بیماری کی تلاش میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، لہذا انہیں طبی مشاورت کے بغیر نہیں لیا جانا چاہیے۔ بنیادی بیماری کے علاج میں تاخیر سنگین نتائج پر منتج ہو سکتی ہے۔
- یہ قابل مشورہ ہے کہ کھانے سے 30 منٹ سے ایک گھنٹہ پہلے یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دافع تشنج ادویہ لی جائیں۔

#### دافع قے

دافع قے تشنج سے وابستہ ریسپیٹر سائٹس کو روکنے کا کام کرتی ہیں۔ یہاں طرح طرح کے انتخاب ہیں مگر عام طور پر استعمال ہونے والی دافع قے میں اینٹی ہسٹامائنز (جیسے پرومیتھازن اور

ڈائمن ہائڈرینیٹ)، اینٹی کولینرجکس (مثال کے طور پر ہائیوسین)، فینوتھیازائنز (مثال کے طور پر پروکلورپیرازائن)، ڈوپامائن اینٹاگونسٹس (مثال کے طور پر میٹوکلوپرامائڈ اور ڈومپریدون)، اور 5HT<sub>3</sub> ریسپٹر اینٹاگونسٹس (مثال کے طور پر اونڈینسٹرون اور گرینیسٹرون) شامل ہیں۔ دافع تشنج ادویہ کا انتخاب بنیادی طور پر قے کی وجہ پر منحصر ہے۔ مثال کے طور پر، ہائیوسین اور اینٹی ہسٹامائنز سفر کی بیماری کو روکنے کے لیے استعمال ہونے والی اہم ادویات ہیں جبکہ کیموتھراپی حاصل کرنے والے مریضوں اور آپریشن کے بعد کی الٹیوں میں قے کے انتظام کے حوالے سے 5HT<sub>3</sub> ریسپٹر اینٹاگونسٹس اہمیت رکھتے ہیں۔

عام طور پر استعمال ہونے والے دافع قے صرف فارمیسی ادویات یا نسخے کی ادویات ہیں۔ وہ گولیاں، کیپسولز، شربت، انجیکشنز، سوپوزٹریز اور پیچز کی شکل میں دستیاب ہیں۔ دافع قے ادویات لینے سے پہلے آپ کو صحت سے متعلق پیشہ ور افراد سے مشورہ کرنا چاہیے۔

### دافع قے کے عام ضمنی اثرات اور احتیاطی تدابیر

دافع قے کی اقسام	عام ضمنی اثرات	احتیاطی تدابیر
1. اینٹی کولینرجکس	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ غنودگی</li> <li>♦ قبض</li> <li>♦ تیز / بے قابو دل کی دھڑکن</li> <li>♦ پیشاب کی فوری ضرورت اور برقراری</li> <li>♦ دھندلی نظر</li> <li>♦ خشک منہ</li> <li>♦ کیکپاہٹ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ بچوں اور ضعیف العمریوں میں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں</li> <li>♦ گیسٹرو ایسوفیگیل ریفلکس بیماری، شدید مایوکارڈیل انفارکشن، ہائپر ٹینشن، ہائپر تھائرائڈزم، اور جو زاویہ بند گلوکوما کے لیے حساس ہیں کے مریضوں میں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں</li> <li>♦ مایسٹھینیا گریوس، پائلورک سٹینوسس، پیرالائٹک آئیلیس اور پروسٹیکٹ انالارجمنٹ والے مریضوں کو نہیں دی جانی چاہیے۔</li> </ul>
2. اینٹی ہسٹامائنز	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ غنودگی</li> <li>♦ سر درد</li> <li>♦ خشک منہ</li> <li>♦ دھندلی نظر</li> <li>♦ قبض</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ بچوں اور ضعیف العمریوں میں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں</li> <li>♦ پروسٹیکٹ انالارجمنٹ، پیشاب کی برقراری اور جو زاویہ بند گلوکوما کا شکار</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ پیشاب کی فوری ضرورت اور برقراری</li> </ul>	<p>ہیں ان مریضوں میں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔</p>
3. فینونہیازائنز	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ غیر معمولی چہرہ اور جسم کی حرکات</li> <li>♦ زیان، چہرے اور جڑے کی غیر ارادی اور ردھمک حرکتیں</li> <li>♦ ہلنا</li> <li>♦ بے چینی</li> <li>♦ بہکنا</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ بچوں اور ضعیف العمریوں میں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں</li> <li>♦ قلبی مرض، پارکنسنز کی بیماری، مرگی، افسردگی، مایستھینیا گریوس، پروسٹیٹک انالرجمنٹ اور جو اینگل کلوژرگلوکوما کا شکار ہیں ان مریضوں میں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔</li> <li>♦ مایستھینیا گریوس، پاٹل اور فیوکروموسیٹوما کے مریضوں کو نہیں دیا جانا چاہیے</li> </ul>
4. ڈوپامائن اینٹاگونسٹس	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ چہرہ اور جسم کی غیر معمولی حرکات</li> <li>♦ غنودگی</li> <li>♦ ہائپرپرولیکٹینیمیا</li> </ul>	<p><b>میٹوکلوبرامائڈ کے لیے</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ بچوں، نوجوان بالغوں اور ضعیف العمریوں میں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں</li> <li>♦ ہائپرٹینشن، قلبی ترسیل میں خلل اور مرگی کے مریضوں میں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں</li> <li>♦ گیسٹرو انٹسٹائنل رکاوٹ، پرفوریشن یا ہیمرج اور فیوکروموسیٹوما کے مریضوں کو نہیں دی جانی چاہیے۔</li> </ul> <p><b>ڈومپرینون کے لیے</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ بچوں میں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں</li> <li>♦ پرولیکٹینوما کے مریضوں میں استعمال نہیں ہونی چاہیے</li> </ul>

<p>5      5HT<sub>3</sub>-رسیپٹر اینٹاگونسٹس</p>	<p>♦ قبض ♦ سر درد ♦ کپکپاہٹ ♦ انجکشن کے مقام کے رد عمل</p>	<p>♦ ذیلی آنتوں کی رکاوٹ کے حامل مریضوں یا جو کیوٹی -وقفہ کی طوالت کا شکار ہوں، ان میں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ ♦ پیدائشی طویل کیوٹی سنڈروم کے مریضوں میں استعمال نہیں ہونی چاہیے ♦ جان لیوا سیروٹونن سنڈروم کے معاملات 5-HT<sub>3</sub> رسیپٹر اینٹاگونسٹ دافع تشنج کے حوالے سے رپورٹ کیے گئے ہیں، خاص طور پر جب دوسرے سیرٹونرجک اور / یا نیورولپٹک ادویات کے ساتھ ملا کر دی جائے۔ اگر ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو علاج روک دینا چاہیے اور معاون علامت کی بنیاد پر علاج شروع کیا جانا چاہیے۔</p>
--	--	--

### دافع قے ادویہ لینے کے بارے میں عمومی مشورہ

- دافع قے ادویہ بنیادی طور پر مستقل علاج کے بجائے علامات میں آرام کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لہذا ان ادویات کے زیادہ استعمال سے گریز کیا جانا چاہیے۔
- چونکہ دافع قے ادویات علامات کو دبانے اور بنیادی بیماری کی تلاش میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، لہذا انہیں طبی مشاورت کے بغیر نہیں لیا جانا چاہیے۔ بنیادی بیماری کے علاج میں تاخیر سنگین نتائج پر منتج ہو سکتی ہے۔
- دافع قے لینے کے بعد ڈرائیو نہ کریں یا مشینری نہ چلائیں، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر غنودگی کا سبب بن سکتی ہیں۔
- دافع قے کو شراب کے ساتھ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر کا اثر مرکزی اعصابی نظام کو دبانے کا ہوتا ہے اور شراب اس طرح کے اثر کو تقویت بخش سکتی ہے، اس طرح سے مضر اثرات پیدا کر سکتی ہے۔
- قے کے بعد کچھ گھنٹوں کے اندر ٹھوس کھانے سے پرہیز کریں، اور زیادہ آرام کریں اور پانی کی کمی کو روکنے کے لیے سیال کے چھوٹے گھونٹ لیتے رہیں۔
- تیز بو اور دیگر محرکات جیسے گرمی اور چمکیلی روشنی سے پرہیز کریں، جو قے کو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

## اپنے ڈاکٹر سے بات چیت کریں

- دافع تشنج اور دافع قے لینے سے پہلے طبی مشورے کی تلاش کریں، خاص طور پر اگر آپ حاملہ ہوں یا دودھ پلاتی ہوں۔
- بچوں یا ضعیف العمروں کو طبی مشورے کے بغیر دافع تشنج اور دافع قے نہ دیں، کیونکہ وہ ادویات کے منفی رد عمل کو زیادہ ابھارتے ہیں۔
- اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اگر جو دوا آپ لے رہے ہیں اس کے اثر سے آپ کو قے آرہی ہو اور خود سے ادویات لینا نہ چھوڑیں۔
- اگر آپ کی قے سبز ہے یا خون کے ساتھ آئے، تو براہ مہربانی فوری طور پر طبی مشورہ حاصل کریں۔
- اگر قے 24 گھنٹے سے زیادہ جاری رہتی ہے، یا اس کے ساتھ پیٹ میں شدید درد یا سر درد ہوتا ہے، یا آپ 12 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک سیال کو نیچے رکھنے کے ناقابل ہیں تو فوری طور پر طبی امداد کی تلاش کریں۔

## دافع تشنج اور دافع قے کی سٹوریج

دافع تشنج اور دافع قے کو ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھنا چاہیے۔ جب تک کہ لیبل پر واضح نہیں کیا جاتا ہے، ادویات کو ریفریجریٹر میں محفوظ نہیں کیا جانا چاہیے۔ مزید برآں، بچوں کے ذریعہ قابل رسائی جگہوں پر ادویات کو مناسب طریقے سے رکھنا چاہیے تاکہ حادثاتی طور پر ان کی جانب سے ان کے نگلے جانے سے بچا جا سکے۔

تسلیم نامہ: ڈرگ آفس پروفیشنل ڈویلپمنٹ اینڈ کوالٹی ایسورنس (PD&QA) کا اس مضمون کی تیاری میں ان کی گراں قدر شراکت پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔

ڈرگ آفس  
محکمہ صحت  
جنوری 2021