

服食藥物須知

- 若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚紅疹、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。
- 副作用通常輕微和短暫。如果副作用持續或變得嚴重，請諮詢醫生。
- 中和胃酸藥有可能干擾某些口服藥物的吸收。應根據藥物標籤指示分隔服藥的時間。
- 如果懷孕、計畫懷孕或正在哺乳，應告知醫生。
- 請告知醫生或藥劑師你正在服用的其他藥物，包括處方藥物、成藥和維他命。



生活模式建議

- 戒煙
- 避免飲用酒精或刺激性飲料，例如咖啡和濃茶
- 確保有足夠的休息和適當的壓力處理

貯存方法

把藥物存放在陰涼及乾燥的地方，避免高溫或光線直接照射。除個別藥物有特別指示外，一般毋須存放在雪櫃內。

把藥物存放在兒童不能觸及的地方。

此藥物資訊只供參考之用。

應按照醫生及藥劑師指示用藥。

如有疑問，請向醫生、藥房職員或其他醫護人員查詢。

切勿將自己的藥物給予他人使用。

藥物簡介

消化性潰瘍藥物



消化性潰瘍指由胃部產生的胃酸令消化道粘膜受損，引致發炎和潰瘍。消化性潰瘍可出現於胃、小腸上段或食道下段。消化性潰瘍最常見的症狀是間歇性腹痛，其他症狀包括胃脹、胃灼熱、噁心、嘔吐、食慾不振等。

消化性潰瘍的常見成因

- 1 幽門螺旋桿菌感染
- 2 長期服用非類固醇消炎藥，例如布洛芬 Ibuprofen、萘普生 Naproxen、阿士匹靈 Aspirin
- 3 吸煙及酗酒

消化性潰瘍藥物


治療由幽門螺旋桿菌感染引起的消化性潰瘍，須使用抗生素和質子泵抑制劑，以達致消滅細菌及幫助潰瘍癒合的作用。須按照指示完成整個抗生素療程。

治療由其他原因引起的消化性潰瘍，通常使用以下藥物：

中和胃酸藥

(三矽酸鎂 Magnesium Trisilicate、氫氧化鋁 Aluminium Hydroxide 及氫氧化鎂 Magnesium Hydroxide)

中和胃酸藥有助中和胃酸，減輕胃酸對胃壁及潰瘍部位的刺激，快速紓緩痛楚。中和胃酸藥通常為咀嚼片劑，須於咬碎後吞服；而水劑須搖勻方可服用。於餐後服用能達至最佳藥效。常見副作用有便秘、腹瀉等。



組織胺二型受體對抗劑 (法莫替丁 Famotidine)

組織胺二型受體對抗劑抑制胃酸分泌，幫助潰瘍癒合。副作用並不常見，例如便秘、腹瀉、頭暈等。



質子泵抑制劑

(奧美拉唑 Omeprazole、埃索美拉唑 Esomeprazole 和泮托拉唑 Pantoprazole)



質子泵抑制劑抑制胃酸分泌，幫助潰瘍癒合。藥物不可咀嚼或壓碎，於餐前服用能達至最佳藥效。質子泵抑制劑有可能會輕微增加胃腸道感染的風險。常見副作用有腹痛、便秘、腹瀉、頭暈等。



需要注意的症狀

如有以下症狀，請立即就醫：

- 嘔吐物帶血或咖啡渣狀物
- 大便呈黑色
- 體重不尋常下降
- 吞嚥困難
- 持續腹痛或嘔吐