

注意事項

- 如有配戴隱形眼鏡，須在使用眼藥水前將其取下。在使用眼藥水最少15分鐘後，才可配戴隱形眼鏡。
- 滴眼藥水後，切勿用手揉眼睛。
- 如需於同一眼睛使用兩種不同的眼藥水或眼藥膏，兩者之間應相隔數分鐘。
- 如有需要，可讓家人或其他人協助使用眼藥水。
- 切勿使用已變色、變壞或過期的眼藥水。



可能出現的副作用

使用眼藥水後，視覺可能會暫時變得模糊，及眼睛出現輕微不適。在視覺恢復清晰之前，切勿駕駛汽車或操作機械。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚紅疹、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

藥物貯存

把藥物存放在陰涼及乾燥的地方，避免高溫或光線直接照射。某些眼藥水須存放於雪櫃，請依照藥物標籤指示。

把藥物存放在兒童不能觸及的地方，避免兒童誤服而發生意外。

眼藥水開啟四星期後便須棄掉。

此藥物資訊只供參考之用。

應按照醫生及藥劑師指示用藥。

如有疑問，請向醫生、藥房職員或其他醫護人員查詢。

切勿將自己的藥物給予他人使用。

眼藥水 使用方法



眼藥膏
滴耳藥水
眼藥水
頭蝨乳劑
疥瘡乳劑



眼藥水 使用方法

1 用肥皂 / 視液徹底洗淨雙手。

2 輕輕搖勻眼藥水。打開眼藥水瓶蓋，注意不要接觸滴咀。

3 將頭仰後，眼向上望，輕輕把下眼皮拉開成一袋形。

4 將眼藥水滴入下眼皮內。切勿讓滴咀接觸到眼睛，睫毛或眼皮，以免弄傷眼睛及染污滴咀。

5 閉上眼睛，用手指輕壓在眼角近鼻樑處數分鐘，防止眼藥水從眼睛流至鼻腔及喉嚨。

6 用乾淨紙巾拭去流出眼外多餘的水份。

7 不要沖洗或抹乾滴咀，用藥後立即把眼藥水蓋好。

