

注意事項

- 如配戴隱形眼鏡，須在使用眼藥膏前將其取下。於整個療程期間不應配戴隱形眼鏡。
- 使用眼藥膏後，切勿用手揉眼睛。
- 如需於同一眼睛使用兩種不同的眼藥水或眼藥膏，兩者之間應相隔數分鐘。
- 如有需要，可讓家人或其他人協助使用眼藥膏。
- 切勿使用已變色、變壞或過期的眼藥膏。



可能出現的副作用

使用眼藥膏後，視覺可能會暫時變得模糊，及眼睛出現輕微不適。在視覺恢復清晰之前，切勿駕駛汽車或操作機械。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚紅疹、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

藥物貯存

把藥物存放在陰涼及乾燥的地方，避免高溫或光線直接照射。除個別藥物有特別指示外，一般毋須存放在雪櫃內。

把藥物存放在兒童不能觸及的地方，避免兒童誤服而發生意外。

眼藥膏開啟四星期後便須棄掉。

此藥物資訊只供參考之用。

應按照醫生及藥劑師指示用藥。

如有疑問，請向醫生、藥房職員或其他醫護人員查詢。

切勿將自己的藥物給予他人使用。

眼藥膏 使用方法



漱口藥水
滴鼻藥水
眼藥膏
滴耳藥水
眼藥水



衛生署
藥物辦公室



眼藥膏 使用方法

1 用肥皂 / 梘液徹底洗淨雙手。



2 打開眼藥膏瓶蓋，注意不要接觸藥膏管口。



3 將頭仰後，眼向上望，輕輕地把下眼皮拉開成一袋形。



4 擠出約一厘米長的眼藥膏於下眼皮內。切勿讓眼藥膏管口接觸到眼睛、睫毛或眼皮，以免弄傷眼睛或染污管口。



5 閉上眼睛片刻，然後眨眼幾次，使眼藥膏均勻分佈在眼內。用乾淨的紙巾拭去眼部周圍多餘的眼藥膏。



6 不要沖洗或抹乾藥膏管口。用藥後立即把眼藥膏蓋好。

