

注意事項

- 避免讓乳劑接觸眼睛。如意外入眼，應立刻以大量清水沖洗眼睛，並於需要時前往求醫。
- 若小孩需接受治療，應由家長或成人為其處理。
- 如再發現有頭蝨，應按照醫生指示再次進行治療。
- 患者家中的各成員以及曾與患者有密切接觸的人士亦應求醫。如有需要，應同時接受治療。



衣物和被鋪的處理方法

患者的被鋪、衣物、梳、帽及毛巾等須與其他人的物品分開並用熱水和清潔劑清洗。

藥物貯存

把藥物存放在陰涼及乾燥的地方，避免高溫或光線直接照射。除個別藥物有特別指示外，一般毋須存放在雪櫃內。

把藥物存放在兒童不能觸及的地方，避免兒童誤服而發生意外。

此藥物資訊只供參考之用。

應按照醫生及藥劑師指示用藥。

如有疑問，請向醫生、藥房職員或其他醫護人員查詢。

切勿將自己的藥物給予他人使用。

頭蝨乳劑 使用方法



滴耳藥水
眼藥水
頭蝨乳劑
疥瘡乳劑



衛生署
藥物辦公室



頭蝨乳劑 使用方法

氯菊酯(Permethrin)1%


用不含護髮素的洗髮露洗淨頭髮。沖水後用毛巾稍為弄乾頭髮至微乾。

讓乳劑留於頭髮上10分鐘。

10分鐘後，用暖水徹底沖洗頭髮上的乳劑。

搖勻乳劑。將乳劑揉搓於頭髮和頭皮上，直至完全濕潤。特別留意髮根、頭皮、後頸、兩鬢、瀏海及耳背。

在頭髮未乾時，用密齒梳從髮根起梳勻頭髮，把依附在頭髮上的蝨及卵全部梳去。



馬拉硫磷(Malathion)0.5%

塗搽乳劑後，讓頭髮自然風乾，並不要包蓋。讓乳劑留於頭髮上過夜或12小時。



12小時後，用不含護髮素的洗髮露徹底洗淨頭髮。