

注意事項

- 不可吞服。
- 使用漱口藥水後，應避免立刻飲食或漱口。

可能出現的副作用

某些漱口藥水可能導致味覺改變，或令牙齒染色。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚紅疹、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

藥物貯存

把藥物存放在陰涼及乾燥的地方，避免高溫或光線直接照射。除個別藥物有特別指示外，一般毋須存放在雪櫃內。

把藥物存放在兒童不能觸及的地方，避免兒童誤服而發生意外。

此藥物資訊只供參考之用。

應按照醫生及藥劑師指示用藥。

如有疑問，請向醫生、藥房職員或其他醫護人員查詢。

切勿將自己的藥物給予他人使用。

漱口藥水 使用方法

陰道塞藥
肛門塞藥
漱口藥水
滴鼻藥水
眼藥膏



衛生署
藥物辦公室



漱口藥水 使用方法

1 先用清水漱口。



2 量度出適量的
漱口藥水。



! 請參照個別藥物標籤指示的
稀釋方法。如使用百里酚複方
(thymol gargle)漱口液，需將
一份漱口藥水用三份清水進行
稀釋。

3 把漱口藥水含於口中
，讓藥水在口腔內來
回沖洗。



4 將漱口藥水吐出。



! 建議漱口時間因產品而異。。

