

注意事項

- 如有需要，可讓家人或其他人協助使用滴鼻藥水。
- 避免在使用滴鼻藥水後立刻打噴嚏或擤鼻涕。
- 不應使用超過處方所指示的時限；使用過久有機會引致副作用。
- 切勿使用已變色、變壞或過期的滴鼻藥水。

可能出現的副作用

使用滴鼻藥水不久後，可能會出現輕微副作用，例如鼻腔感到乾燥、刺痛或灼熱。某些滴鼻藥水可能會在口腔留下味道。如出現此情況，可以用清水漱口。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚紅疹、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

藥物貯存

把藥物存放在陰涼及乾燥的地方，避免高溫或光線直接照射。除個別藥物有特別指示外，一般毋須存放在雪櫃內。

把藥物存放在兒童不能觸及的地方，避免兒童誤服而發生意外。

已經過期或不再需要使用的滴鼻藥水便須棄掉。


此藥物資訊只供參考之用。

應按照醫生及藥劑師指示用藥。

如有疑問，請向醫生、藥房職員或其他醫護人員查詢。

切勿將自己的藥物給予他人使用。

滴鼻藥水 使用方法



肛門塞藥
漱口藥水
滴鼻藥水
眼藥膏
滴耳藥水

 衛生署
藥物辦公室



滴鼻藥水 使用方法

1 使用滴鼻藥水前先輕輕擤鼻涕，以排清鼻腔內的黏液。




2 用肥皂/梘液徹底洗淨雙手。



3 打開滴鼻藥水的瓶蓋。

4 坐在椅上，靠著椅背將頭仰後；或躺在床上，將枕頭放在肩背下，使頭部仰後。



5 小心將滴咀對準鼻孔，按指示將所需滴數滴入鼻孔內。

! 不要讓滴咀接觸到鼻腔內壁，以免染污滴咀。

6 頭部保持仰後約兩分鐘，讓藥水流入鼻內。



7 不要沖洗滴咀。把藥水瓶蓋好。

