

注意事項

- 如塞藥太軟，可將塞藥放入雪櫃〔非冰格〕一會兒，令塞藥適合使用。



- 個別肛門塞藥須存放於雪櫃，請依照藥物指示。如塞藥經過冷藏，可先將塞藥放置在室溫一會兒，然後使用。
- 如有需要，可在使用前在塞藥較尖的一端塗上清水或水溶性潤滑劑。
- 用藥後有機會出現想將塞藥排出的感覺。此種感覺於塞藥融化後會自然消失，通常需要數分鐘。
- 如只需使用半粒塞藥，應把塞藥垂直切開兩半。保留剩餘半粒塞藥作下一劑用。

可能出現的副作用

在使用肛門塞藥不久後，可能會出現輕微副作用，例如肛門輕微灼熱或刺痛、腹瀉、及腸胃不適。

若於使用藥物後出現過敏反應如皮膚紅疹、面部或手部腫脹、呼吸困難等，請立即求醫。

藥物貯存

把藥物存放在陰涼及乾燥的地方，避免高溫或光線直接照射。除個別藥物有特別指示外，一般毋須存放在雪櫃內。

把藥物存放在兒童不能觸及的地方，避免兒童誤服而發生意外。

此藥物資訊只供參考之用。

應按照醫生及藥劑師指示用藥。


如有疑問，請向醫生、藥房職員或其他醫護人員查詢。

切勿將自己的藥物給予他人使用。

肛門塞藥 使用方法



陰道塞藥
肛門塞藥
漱口藥水
滴鼻藥水

 衛生署
藥物辦公室



肛門塞藥 使用方法

1 用肥皂/梘液徹底洗淨雙手。

2 如有需要，可戴上手指套或即棄手套。


3 除去塞藥的包裝。



4 身體側臥，保持下側腿伸直，並將上側腿向腹部方向屈曲。

5 用一隻手將臀部肌肉提起，使肛門外露。

兒童可俯臥在成人的大腿上。



6 放鬆肛門，用另外一隻手將塞藥從較尖的一端塞入肛門（嬰兒約兩厘米深，成人約三厘米深）。

7 將雙腿合攏，收緊臀部幾秒，維持側臥姿勢5至15分鐘，以防塞藥倒擠出來。

交疊雙腿而坐的姿勢亦可。

8 棄掉手指套或即棄手套，再次洗淨雙手。